



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

Otoplastie
(correctie uitstaande oren)

OTOPLASTIE

Inleiding

Afstaande oren komen veel voor.

Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De afstaande oorschelpen kunnen chirurgisch worden gecorrigeerd. Otoplastie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar, bij voorkeur als het kind er zelf om vraagt.

Behandeling

Het rechtzetten van afstaande oren gebeurt meestal onder algemene verdoving. Uw kind kan na een paar uur al weer naar huis. Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt gehermodelleerd en er wordt een stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dicht tegen het hoofd komt, verwijderd. De oorschelpen worden gefixeerd met inwendige draadjes.

Nazorg

Na een oorcorrectie krijgt uw kind een strak verband om het hoofd dat vijf tot zes dagen aanwezig blijft. Het wassen van het haar en dergelijke zal dus een poosje moeten uitgesteld worden.

Als het verband verwijderd is, moet uw kind nog ongeveer twee weken 's nachts een haarband of zwachtel dragen ter bescherming van de oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met de oren, bijvoorbeeld als het kind sport. Zwemmen wordt best vermeden gedurende zes weken na de operatie. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.

Tegen de pijn kunt u uw kind pijnstillers bijgeven (bijvoorbeeld Paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden neemt u best onmiddellijk contact op met de chirurg of de dienst spoedgevallen. De hechtingen worden na 10 tot 14 dagen verwijderd.

Bijkomende informatie

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden, soms met misvorming van de oorschelp als gevolg. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed.

Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100 % worden gegarandeerd. Soms is het noodzakelijk om nog een bijkomende correctie uit te voeren. Zelden ontstaat er reactie op de inwendige fixatiedraden. Soms is het noodzakelijk één of meerdere draden te verwijderen.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelende arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw behandelende arts aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw arts of de kinderafdeling van het ziekenhuis.